



\*) *Mittelmengen bei Baumobst je ha und m Kronenhöhe*

\*\*) § 22 (2): *Anwendung des Mittels ist nur zulässig in Betrieben, denen eine Genehmigung nach § 22 (2) PflSchG erteilt wurde.*

### Kernobst

**Schorf:** Für den morgigen Freitag sind weiterhin Schauer mit unterschiedlichen Regenmengen vorhergesagt. Für Liel und Mengen wird ein starker Ascosporenflug prognostiziert. Für Anlagen, die seit mehr als 4 – 5 Tagen keine Vorlagebehandlung mehr gesehen haben, wird eine Behandlung mit bspw. Delan WG 0,25 kg\* oder Syllit empfohlen. Momentan ist es noch zu windig, daher die Abendstunden abwarten.

### Steinobst

**Pflaumensägewespe:** In bekannten Befallsanlagen sind die Weißtafelfänge hoch (bei Ihringen seit 3.4. etwa 280 Exemplare, in anderen Anlagen, bspw. Laufen, mit 25 seit 5.4. bislang noch eher gering. Gegen Blühende sollte kontrolliert und ggf. behandelt werden. Die Schadschwelle ist bei mehr als vier Eiablagestellen von 100 Fruchtkelchen erreicht. Die Nebenwirkungen von Calypso 0,1 l\* oder Mospilan SG 0,125 kg\* sind bei der Behandlung zu nutzen, Blattläuse werden miterfasst. Die Anwendung in die Blüte sollte möglichst in den Abendstunden erfolgen.

### IP-Begehungen

Dienstag, 17.4.:                    9:30 Uhr Egringen  
                                          13:30 Uhr Niedereggenen

**Für alle anderen Indikationen bitte den WD Nr. 12 beachten.**

**Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Kulturführung und Pflanzenschutz!**