



*\*) Mittelmengen bei Baumobst je ha und m Kronenhöhe*

*\*\*\*) § 22 (2): Anwendung des Mittels ist nur zulässig in Betrieben, denen eine Genehmigung nach § 22 (2) PflSchG erteilt wurde.*

*WZ = Wartezeit; Beh. = Behandlung*

**Für viele Präparate gilt die Auflage B1 – bienengefährlich. Blühender Unterwuchs ist vor den Behandlungen zu mulchen.**

### **Kernobst**

**Birnblattsauger:** In einzelnen Anlagen steigt der Befall an. Wenn mehrheitlich Larven vorhanden sind, kann mit Vertimec Pro (0,375 l/ha u. m Kronenhöhe, max. 0,75 l/ha, max. 1x, WZ 28 Tage) behandelt werden. Bei starkem Eibesatz (gelboranges Stadium) und Larven an den Triebspitzen wird der Einsatz von Movento SC 0,75 l\* (max. 2 x, max. 2,25 l/ha, **B1** !) möglichst in den Abendstunden empfohlen. Hinweise zu Einsatz siehe WD Nr. 19

### **Steinobst (Für Großmarktanlieferer: Tafelkirschen max. 4/5 Wirkstoffe ab Blühende!)**

Ernteprognose Zwetschgen: Ruth Gerstetter 20.6.; Hermann wenige Tage danach; Katinka 1. Juliwoche

**Pflaumenwickler:** In den Frühsorten ab Katinka (v.a. in Befallslagen/Anlagen mit schwachem Behang) wird 4 Wochen vor der Ernte (d.h. in den nächsten Tagen) eine Behandlung mit Insegar 0,2 kg\* (max. 2 x, max. 0,6 kg/ha, WZ 28 Tage, **B1** !) empfohlen. Blattläuse vor der Bildung von Honigtau (wg. **B1**-Auflage) bekämpfen. Vor der Beh. mulchen.

**Rote Austernschildlaus (Zwetschge, Mirabelle):** Bei starkem Befall werden zwei Behandlungen mit Movento SC empfohlen. Crawler (Wanderlarven) sind zu ca. 50 % geschlüpft. Movento 100 SC 0,75 l/ha\* (max. 2 x, **B1** !) kann aufgrund der Notfallzulassung eingesetzt werden. Hinweise zu Einsatz siehe WD Nr. 19. Die WZ von 21 Tagen beachten. **Kirschen:** Beh. gegen San-José-Schildlaus einplanen, dazu nächste Hinweise beachten.

**Fruchtmonilia:** Zur Bekämpfung stehen 0,2 l\* Luna Experience (2 Wirkstoffe!, max. 2 x; WZ 7 Tage) / 0,25 kg\* Signum (2 Wirkstoffe!, max. 3 x; WZ 7 Tage) / 0,5 kg\* Teldor (max. 3 x; WZ 3 Tage) zur Verfügung. In anfälligen Sorten und bei feuchter Witterung werden Beh. empfohlen. Durch an der Frucht klebende Blütenreste konnten vergangene Woche bereits Infektionen entstehen. Für Großmarktanlieferer: Luna Experience einsetzen.

### **Strauchbeeren (Für Großmarktanlieferer: max. 5 Wirkstoffe ab Blühbeginn!)**

Ernteprognose: Jonkheer van Teets max. 5.6.; frühe Stachelbeeren 1. Juniwoche.

### **Beikrautregulierung**

Der feuchte Boden ist optimal für den Einsatz von Bodenherbiziden auf überwiegend unkrautfreiem Boden mit bspw. Stomp Aqua 3,5 l/ha plus Spectrum 1,4 l/ha. Anwendungsbestimmungen von Stomp Aqua beachten (Fahrgeschw. Max. 7,5 km/ha, Windgeschw. Max. 3 m/s). Nicht im Pflanzjahr, im Kernobst bis BBCH 73/74 (T-Stadium), im Steinobst bis BBCH 73 (2. Rötelfruchtfall), im Schalenobst bis BBCH 55.

### **Veranstaltungen & Neuigkeiten**

IP-Begehung: Dienstag, 29.5.

9:30 Egringen, 13:30 Niedereggenen

Kirschenbegehung LTZ Augustenberg und LRA Karlsruhe: Für Erwerbsobstbau am Dienstag, 19. Juni 2018, 18 - 20 Uhr. Für Fachwarte und Vereine am 20.6., 18 - 20 Uhr. Obsthof LTZ Augustenberg, Neßlerstr. 25, 76227 Karlsruhe.

**Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Kulturführung und Pflanzenschutz!**