



**) Mittelmengen bei Baumobst je ha und m Kronenhöhe*

****) § 22 (2): Anwendung des Mittels ist nur zulässig in Betrieben, denen eine Genehmigung nach § 22 (2) PflSchG erteilt wurde.*

WZ = Wartezeit; Beh. = Behandlung

Empfehlungen für Anlagen mit Hagelschäden siehe WD Nr. 24 vom 17. Mai.

Kernobst

Schorf: Wo die Anlagen noch nicht auf Schorfbefall kontrolliert wurden, wird bei der momentanen Gewitterneigung an die Vorlagebehandlung mit einem Belagsfungizid erinnert. Vor allem die Früchte sind noch infektionsempfindlich. Vorgehensweise ab Ende der Primärsaison siehe WD Nr. 27. Möglich sind bspw. Delan WG 0,25 kg* (max. 12 x), Malvin WG 0,6 kg* (max. 13 x), Merpan 80 WDG 0,625 kg* (max. 5 x), Merpan 48 SC 1 l* (max. 5 x). Bis zum Triebabschluss die Mehltaubehandlungen fortführen.

Mangelsymptome, Blattflecken, frühzeitiger Blattfall: Zur Vermeidung wird in anfälligen Sorten wie Golden Delicious, Braeburn, Kanzi, Fuji und Gala die Handwerker-Mischung als Solobehandlung empfohlen (5kg Harnstoff + 20 kg Bittersalz + 1 kg Solubor in 1.000 l Wasser/ha). Bei o.g. Sorten die Beh. 2 – 3 x alle 10 Tage wiederholen.

Apfelwickler: Wo an Pfingsten die erste Coragen-Beh. stattgefunden hat, wird ca. 3 Wochen danach eine Anschlussbehandlung mit Steward 0,085 kg* empfohlen. Wo bisher noch keine Maßnahme erfolgte oder die erste Beh. mit Steward oder Mimic erfolgte, wird ab jetzt eine Behandlung mit Coragen 0,0875 l* empfohlen. Der Flug des Kleinen Fruchtwicklers hat inzwischen auch begonnen. Wo der Druck der 2. Apfelwicklergeneration nicht stark ist oder wenig Zuflug aus der Umgebung vorhanden ist, können auch zwei Coragen-Behandlungen gegen die 1. Generation verwendet werden. Granulosevirusbeh. zur Reduzierung des Befallsdrucks aufgrund geringer UV-Stabilität regelmäßig nachlegen.

Steinobst

Kirschfruchtfliege/Kirschessigfliege: Über vergangenes Wochenende stiegen die Fänge auf den Gelbtafeln an. In Industriekirschen wurde auf Befruchtersorten stärkere Eiablage der K.essigfliege gefunden. Bei Befall können diese Bäume einzeln behandelt werden, um einer Ausbreitung in der Anlage vorzubeugen. Hinweise zur Bekämpfung siehe WD Nr. 25. Bei Tafelkirschen bisher einzelne Eiablagen. Dies kann sich bei vorherrschender Witterung jedoch schlagartig ändern. Außerdem muss die Wartezeit von 5/7 Tagen (je nach Präparat) beachtet werden. Ein kurzfristiges Eingreifen ist daher nicht möglich.

Pflaumenwickler: Für Sorten mit Reife ab Mitte Juli (ab Cacaks Schöne) kann in Anlagen mit schwächerem Behang eine erste Behandlung mit Insegar 0,2 kg* (**B1** !, max. 0,6 kg/ha, max. 1,2 kg/ha u. Jahr, WZ 28 Tage) durchgeführt werden. Für Sorten mit Ernte ab Ende Juli (ab Hanita) wird eine erste Behandlung empfohlen.

Sprühflecken: Bei vorhandenem Befall können durch Behandlungen nach der Ernte mit bspw. Merpan 80 WDG 0,75 kg* (max. 3 x, WZ 21 Tage), Merpan 48 SC 1,25 l* (max. 3 x, WZ 21 Tage), Delan WG 0,25 kg* (max. 3 x, WZ 21 Tage) oder Systhane 20 EW 0,225 l* (max. 2 x, WZ 21 Tage) die Infektionen durch Sommersporen (Konidien) eingedämmt werden.

Strauchbeeren

Erinnerung an Fruchtfäulen- und Falscher Mehltau-Beh. (siehe WD Nr. 21 & 24).

Stachelbeermehltau: Bei Solostrategie mit Kumar traten Blattflecken auf.

Pflanzenschutzwarndienst Erwerbsobstbau Südbaden

Schalenobst

Marssonina: Optimale Infektionsbedingungen liegen bei einer Blattnassdauer von mind. 6 Stunden und einer Temperatur von 15 – 21 °C vor. Nach § 22 (2) ist die Anw. des Belagsfungizid Delan WG** 0,25 kg* (max. 2 x, WZ 60 Tage) möglich.

Veranstaltungen & Neuigkeiten

Beerenbegehung, Obstversuchsgut Heuchlingen: 5. Juni 2018, 15.00 Uhr.

Kirschenbegehung LTZ Augustenberg und LRA Karlsruhe: Für Erwerbsobstbau am Dienstag, 19. Juni 2018, 18 - 20 Uhr. Für Fachwarte und Vereine am 20.6., 18 – 20 Uhr. Obsthof LTZ Augustenberg, Neßlerstr. 25, 76227 Karlsruhe.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Kulturführung und Pflanzenschutz!

Falls Sie keine Mitteilungen des Fachbereichs Landwirtschaft im Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald mehr erhalten möchten, dann senden Sie bitte an den Absender eine kurze E-Mail-Nachricht. Nach Eingang Ihrer Abbestellung werden wir umgehend Ihre persönlichen, zum Zweck des Newsletterbezugs gespeicherten Daten löschen.