



Nr. 10/24

LANDRATSAMT ORTENAUKEIS  
AMT FÜR LANDWIRTSCHAFT  
ÜBERGEBIETLICHE  
PFLANZENSCHUTZBERATUNG

Warndienst für Stein- und Beerenobst



20.03.2024

\* Mittelmengen bei Baumobst je ha und m Kronenhöhe

§ 22,2 Die Anwendung des Mittels ist nur zulässig in Betrieben, denen eine Genehmigung nach § 22,2 Pflanzenschutzgesetz erteilt wurde

### Witterung und Vegetationsstand

Heute gibt es nochmal sonniges Frühlingswetter mit Temperaturen bis 20 °C. Morgen bewölkt mit einer gewissen Schauerneigung am Vormittag. Nach einem trockenen Freitag wird es ein verregnetes Wochenende geben, dann wieder bei rückläufigen Temperaturen, es bleibt vorerst frostfrei. Die meisten Zwetschgen stehen in Vollblüte, bei frühblühenden Kirschen und Johannisbeeren öffnen sich die ersten Blüten.

### Steinobst: Blütenmonilia

Das unbeständige Wetter führt zu einem hohen Infektionsrisiko.

**Pfirsich, Nektarine:** Bei noch blühenden Sorten wird eine abschließende Behandlung mit z.B. Belanty 1,0 l (LWF, max. 1,8 l / ha, max. 2x), Luna Experience 0,2 l\* (max. 2x) oder Switch (0,3 kg, max. 2x) empfohlen.

**Zwetschgen, Pflaumen, Mirabellen, Kirschen:** Hier wird je nach Blühfortschritt eine erste bzw. zweite Behandlung mit z.B. Belanty 1,0 l (LWF, max. 1,8 l / ha, max. 2x), Score 0,075 l\* oder Luna Experience 0,2 l\* empfohlen. Alle Mittel haben eine Nebenwirkung auf Schrotschuss.

Bei Verwendung von Switch: Aufwandmenge Zwetschgen = 0,3 kg\*, Kirschen = 0,2 kg\*.

### Johannisbeere, Heidelbeere: Spinnmilbe, Schildläuse

Bei spätblühenden Johannisbeeren und bei Heidelbeeren könnte der heutige Tag noch für eine Ölbehandlung genutzt werden.

Mittelwahl Strauchbeeren: Promanal HP 24 l / ha.

Weitere Details zur Ölbehandlung s. WD 08 vom 07.03.24

### Heidelbeere: Frostspanner

Im Folientunnel auf Frostspannerbefall kontrollieren. Bei Befall Mittelwahl Dipel DF gegen Larvenstadium 1, maximal L 2 (1,0 kg, 3x, WZ 2 Tage im GWH).

### Zwetschge, Pflaume, Mirabelle: Kleine Pflaumenlaus

In Spätlagen bestehen nochmals gute Bedingungen für eine Behandlung mit Mospilan SG (**0,125 kg\***, max. 2x) mit gleichzeitiger Wirkung auf Sägewespe, falls noch nicht behandelt wurde. Als Alternative zu Mospilan SG kann Teppeki 0,07 kg\* verwendet werden.

**Pflaumensägewespe:** Erste Adulte sind unterwegs. Vorgehensweise: Mospilan SG Mitte bis Ende der Blüte oder Kontrolle auf Fruchtbefall nach der Blüte und dann ggf. eine Behandlung einplanen.

*Die Angaben ersetzen nicht die Gebrauchsanleitung, insbesondere sind die Anwendungsbestimmungen zu beachten. Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Kenntnisstand der Verfasser. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit sowie eine Haftung für Irrtümer oder Nachteile, die sich aus den Empfehlungen ergeben könnten, wird nicht übernommen.*



## **Stachelbeere, Johannisbeere: Mehltau**

Die Infektionsgefahr steigt mit zunehmenden Temperaturen.

Es wird eine erste bzw. weitere Behandlung mit Kumulus WG 4 kg oder bei Mehltauanfälligen Sorten mit einem synthetischen Fungizid wie z.B. Flint 0,3 kg, Talendo 0,375 l oder Nimrod 1,0 l empfohlen.

**Blasenläuse:** An Fröhsorten sind bereits erste Befallsstellen zu finden. Gleichzeitig sind Nützlinge wie Marienkäfer und Schwebfliegenlarven anzutreffen. Empfehlung: Befallsentwicklung beobachten. Falls Wirkung der Nützlinge zu gering, nächste Woche Behandlung mit Mospilan SG 0,25 kg oder Teppeki 0,14 kg einplanen.

## **Erdbeere im Tunnel: Botrytis**

Zur Vollblüte (ca. 50% offener Blüten) eine weitere Behandlung mit Kenja 1,2 l oder Switch 1 kg durchführen. Auf Blattläuse und Spinnmilben kontrollieren. Bei Befall Behandlung siehe WD Nr. 08.

**Erdbeere mit Doppel- und Einfachabdeckung:** Bestände aufdecken und auf Blattläuse und Spinnmilben kontrollieren. Bei Blattlausbefall heute oder am Freitag eine Behandlung mit Movento SC 100 0,75 l (bis 14 Tage vor Blüte – nur noch in Spätlagen möglich, B1) oder mit Teppeki 0,14 kg einplanen. Bei geringem Spinnmilbenbesatz ist die Nebenwirkung von Movento ausreichend, andernfalls Spinnmilben mit einem Akarizid gezielt bekämpfen: Milbeknock Top 1,25 l vor der Blüte oder ab Blühbeginn Kiron 3 l mit Wartezeit von 21 Tagen.

## **Zulassungsverlängerungen**

**XenTari, Florbac, Lepinox Plus** bis zum 30.04.25

**Karate Zeon** bis zum 30.09.24

## **Widerruf der Zulassung**

Die Zulassung von Movento SC 100 wird zum 30.04.2024 widerrufen. Es besteht eine Abverkaufsfrist bis 30.10.2024 und eine Aufbrauchfrist bis 30.10.2025.

Grund für den Widerruf ist, dass die Genehmigung für den Wirkstoff Spirotetramat gemäß [Durchführungsverordnung \(EU\) 2022/489](#) ausläuft.

## **Freilandschulungen zur Integrierten Obstproduktion**

### **Mittelbaden:**

**Donnerstag, 21.03., 17.00 Uhr** in Erlach und Ortenberg. Anfahrt zum Standort Ortenberg ist wegen Sperrung des Bahnübergangs nur über den Südring (Umleitungsstrecke ist ausgeschildert) möglich.

### **Freitag, 22.03.:**

08:30 in Oberkirch-Zusenhofen, 10:30 in Oberkirch Tiergärtnerweg, 13:30 in Mösbach.

**Südbaden: Dienstag, 26.03.,** 9.30 Uhr in Egringen, 13.30 Uhr in Niedereggenen.

Der nächste Warndienst erscheint je nach Vegetationsfortschritt.

*Die Angaben ersetzen nicht die Gebrauchsanleitung, insbesondere sind die Anwendungsbestimmungen zu beachten. Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Kenntnisstand der Verfasser. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit sowie eine Haftung für Irrtümer oder Nachteile, die sich aus den Empfehlungen ergeben könnten, wird nicht übernommen.*

