



Nr. 26/24

LANDRATSAMT ORTENAUKREIS
AMT FÜR LANDWIRTSCHAFT
ÜBERGEBIETLICHE PFLANZENSCHUTZBERATUNG



05.06.2024

* Mittelmengen bei Baumobst je ha und m Kronenhöhe

§ 22,2 Die Anwendung des Mittels ist nur zulässig in Betrieben, denen eine Genehmigung nach § 22,2 Pflanzenschutzgesetz erteilt wurde

Witterung:

Für heute Nachmittag werden Schauer vorhergesagt. Donnerstag/Freitag soll es trocken bleiben, bevor zum Wochenende erneut Regen gemeldet wird. Die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich zwischen 22 und 25 °C

Apfelmehltau:

Nach dem Regen steigt wieder der Mehltaudruck. Bei anfälligen Apfelsorten sollten Behandlungen im Abstand von 10 Tagen beibehalten werden.

Apfelwickler (s.a. letzten Warndienst):

Während der vergangenen Regenperioden waren Eiablage und Einbohrbedingungen eher gering. Mit den wärmeren und trockeneren Witterungsbedingungen in dieser Woche sind die Eiablage Bedingungen wieder günstig. Wo die erste Coragen Behandlung erst nach Pfingsten erfolgte, sollte spätestens Anfang nächster Woche die Anschlussbehandlung erfolgen. Ansonsten bei bereits erfolgter zweiter. Coragen Behandlung im Abstand von 2 ½ Wochen mit der Minecto One Anschlussbehandlung Mitte Juni fortfahren. Beachten Sie auch die Empfehlung zur Granulosevirus Beimischung in reduzierter 1/3 Aufwandmenge zu sonstigen Pflanzenschutzmaßnahmen.


Obstbaum Spinnmilbe:

Siehe letzten Warndienst Nr. 25.

Rote Austernförmige Schildlaus an Birne:

Symptome an Birnen sind schütterere Bäume mit verhaltenem Trieb bis hin zu absterbenden Zweigen, am Holz weiße verteilte kleine Punkte (männliche Schilde, kleiner als bei der Maulbeerschildlaus) und unter Algen/Flechten/Moos nach Öffnen der Deckel weiße Flecken (s. Bild). Lebende Weibchen sind rotbraun, reife Eier und junge Wanderlarven lachsfarben.

Der Schlupf der Crawler hat letzte Woche eingesetzt. Wir empfehlen jetzt den Einsatz von Movento 100 SC 0,75 l*, max. 1,875 l/ha (max. 2x, max. 3,75 l/ha und Jahr, **B1 blühende Fahrgassen vorher mulchen**, WZ 21 Tage). Bei stärkerem Besatz ist eine Anschlussbehandlung nach 2- 2 ½ Wochen erforderlich. Behandlungen gegen den Birnblattsauger sind dabei zu berücksichtigen. Zu Birnblattsauger siehe vorherige Warndienste.



Absenkung des Rückstandshöchstgehaltes (RHG) von Dithianon in Apfel und Birne

Die Absenkung des RHG von Dithianon (Alcoban, Caldera, Delan WG, Delan Pro u. a.) erfolgt ab dem 05.12.2024 in Kernobst von bisher 3,0 mg/kg auf künftig 1,5 mg/kg ohne Übergangsregelung. Das bedeutet, dass auch früher geerntete Früchte den neuen RHG ab diesem Datum einhalten müssen. Durch die bereits auf 42 Tage verlängerte Wartezeit von Delan WG kann die neue Vorgabe eingehalten werden.

Zulassungsverlängerung:

Vorox F / Nozomi bis zum 30.06.2025

Flowbrix bis zum 30.06.2025

Der nächste Warndienst erscheint voraussichtlich Mitte Juni.

Die Angaben ersetzen nicht die Gebrauchsanleitung, insbesondere sind die Anwendungsbestimmungen zu beachten. Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Kenntnisstand der Verfasser. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit sowie eine Haftung für Irrtümer oder Nachteile, die sich aus den Empfehlungen ergeben könnten, wird nicht übernommen.

