

Strategie Kirschfruchtfliege (KFF) und Kirschessigfliege (KEF) 2026

Zulassungsübersicht (Produkte mit Wirkung / Nebenwirkung auf KFF und KEF):

Mittel	Wirkstoff (Zulassungs-Nr.)	Indikation	Aufwand / ha m Kh	Aufwand max. / Beh.	max. Anzahl Beh.	Warte- zeit (Tage)	Bienen- schutz	BBCH- Stadium	Wirkungs- dauer ca. (Tage)	Kommentar
Exirel	Cyantraniliprole (Zul.-Nr: 00A670)	KEF, KFF	0,375 l	1,0 l	2 (1x in WSG)	7	B1	BBCH 81 - 87	max. 7*	Art. 53 Notfallzulassung 19.05.-15.09.26
SpinTor	Spinosad (Zul.-Nr: 005314)	KEF	0,075 l	0,15 l l	2	5	B1	BBCH 81 - 87	max. 7	Art. 53 Notfallzulassung 19.05.-15.09.25
Mospilan SG	Acetamiprid (Zul.-Nr: 005655)	KFF	0,125 kg		2	7	B4 (Mischung Azole B1)		max. 7*	Nebenwirkung KEF
Karate Zeon	lambda- Cyhalothrin (Zul.-Nr: 024675)	Fruchtschädi- gende Wanzen (z.B. Marmorierete Baumwanze)	0,0375 l	0,075 l	1	14	B4 (Mischung Azole B2)	BBCH 74-85		Art. 53 Notfallzulassung: 01.05.-28.08.25; NW KEF

*Abwaschung nach Niederschlägen ab 10-15 mm, je nach Intensität des Regenereignisses

Bekämpfungs-Strategie:

Kirsch- woche	Tafelkirschen Hauptsorten als Beispiele	Geschätzter Erntebeginn	Mospilan SG 3 Wochen vor Erntebeginn	Mospilan SG 2 Wochen vor Erntebeginn	Exirel (WZ 7) 1 Woche vor Erntebeginn	Spintor (WZ 5) 5 Tage vor Erntebeginn
2	Burlat, Sweet Aryana	ca. 26.05.	---	---	<i>Exirel</i> => bereits erfolgt	---
3	Bellise, Merchant, Early Star	ca. 02.06.	---	<i>Mospilan SG</i> => bereits erfolgt	<i>Exirel</i> => bereits erfolgt	---
4	Carmen, Grace Star, Samba	ca. 11.06.	20.05.=> bereits erfolgt	27.05.	03.06.	Zusatz-Behandlung mit SpinTor nur bei hohem KEF-Druck
5	Van, Schneiders, Tamara	ca. 16.06.	25.05. => bereits erfolgt	01.06.	08.06.	
6	Kordia, Hedelfinger	ca. 21.06.	31.05.	07.06.	14.06.	
7	Regina, Sweetheart	ca. 27.06.	06.06.	13.06.*	20.06.	
8	Späte Sauerkirschen, Schattenmorelle	ca. 04.07.	13.06.	20.06.*	27.06.	

*Die zweite Mospilan-Behandlung bei hohem KEF-Druck ggf. mit Spintor kombinieren.

Kirsch- woche	Schüttelkirschen	Geschätzter Erntebeginn	Mospilan SG 3 Wo. vor Erntebeginn	Mospilan SG 2 Wo vor Erntebeginn	Exirel (WZ 7) 1 Wo vor Erntebeginn	Spintor (WZ 5)
3-4	Frühe Befruchtersorten		18.05. <i>bereits erfolgt</i>	25.05. <i>bereits erfolgt</i>	01.06.	
4-5	Dolleseppler für Industrie	Ab ca. 12.06.	22.05. <i>bereits erfolgt</i>	29.05.	05.06.	<i>ggf. 5 Tage vor Ernte Behandlung mit Spintor bei hohem KEF-Druck</i>
6-7	Benjaminer	Ab ca. 24.06.	02.06.	09.06.*	16.06.	
7-8	Brennkirschen für Brennerei	Ab ca. 27.06.	05.06.	12.06.*	19.06.	

***Die zweite Mospilan-Behandlung bei hohem KEF-Druck ggf. mit Spintor kombinieren.**

Die Erntetermine können je nach Behang und Höhenlage um mehrere Tage abweichen. Bei schwachem Behang ist eine frühere Reife bei der Terminierung der Behandlungen zu berücksichtigen. Generell sind die Behandlungen nach Reifegruppen zu terminieren.

LRA Ortenaukreis, Amt für Landwirtschaft